

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie Via Irnerio, 48

LABORATORIO DI NEUROFARMACOLOGIA MOLECOLARE

Prof. sanzio Candeletti

Laura Rullo, RTT

Loredana Losapio, Post-doc Camilla Morosini, dottoranda Antonio Lacorte, dottorando Marco Cristani, dottorando Paolo Mangione, dottorando


LINEE DI RICERCA

Studio del ruolo di differenti sistemi neuromodulatori endogeni in:

- Dipendenza da sostanze d'abuso
- Modulazione della trasmissione nocicettiva
- Risposte allo stress
- Ruolo delle esperienze sociali precoci nello sviluppo di disturbi neuropsichiatrici
- Neuroinfiammazione




Ricerca sperimentale preclinica in vitro, in vivo, ex vivo:



Trattamenti su colture cellulari (es. cellule Bv2, microgliali)

Trattamenti acuti e cronici nel ratto/topo e prelievo delle aree cerebrali interessate (ex vivo)





Cortex



Targets molecolari di ricerca












- Alterazioni a livello dei meccanismi di trasduzione del segnale (es. Western Blotting, ELISA)
- Alterazioni a livello dell'espressione genica (Real Time PCR)
- Meccanismi epigenetici nel controllo dell'espressione genica (metilazione del DNA)
- Studio dei processi di degradazione tramite analisi del proteasoma
- Analisi dei sistemi di enzimatici antiossidanti



TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE

Real-time qPCR: espressione genica






Per ogni campione si ottiene una curva di amplificazione il cui C_T (Threshold Cycle) è inversamente proporzionale alla quantità di template iniziale




TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE

Western Blotting: espressione proteica




Esempio di espressione proteica di **CREB**, fattore di trascrizione che modula l'espressione di geni coinvoilti in funzioni neuronali, come memoria e dipendenza da sostanze:





TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE

Metilazione del DNA



Regolazione della trascrizione


| Mark* | Transcriptionally relevant sites† | Transcriptional role; |
|---|--|---------------------------|
| DNA methylation | | |
| Methylated cytosine (meC) | CpG islands | Repression |
| Histone PTMs | | |
| Acetylated lysine (Kac) | H3 (9, 14, 18, 56), H4 (5, 8, 13, 16), H2A, H2B | Activation |
| Phosphorylated serine/ threonine (S/Tph) | H3 (3, 10, 28), H2A, H2B | Activation |
| Methylated arginine (Rme) | H3 (17, 23), H4 (3) | Activation |
| Methylated lysine (Kme) | H3 (4, 36, 79) H3 (9, 27), H4 (20) | Activation Repression |
| Ubiquitylated lysine (Kub) | H2B (123\$/120¶) H2A (119¶) | Activation Repression |
| Sumoylated lysine (Ksu) | H2B (6/7), H2A (126) | Repression |
| Isomerized proline (Pisom) | H3 (30-38) | Activation/ repression |



1. Farmacologia delle sostanze d'abuso





Delta-9-THC
Nicotina
MDMA (ecstasy)
Cocaina
Oppiacei
Alcool






Studio del potenziale ruolo terapeutico della psilocibina in ansia, depressione e disordini correlati allo stress








2. Dolore cronico/neuropatico






Impiego di diversi modelli animali:

- CCI
- Dolore da chemioterapici (oxalilplatino, bortezomib)
- SNI





3. Stress sociale e neurosviluppo



Indagini comportamentali e molecolari per studiare l'impatto dell'isolamento sociale durante il periodo perinatale o l'adolescenza sullo sviluppo di disturbi neuropsichiatrici in età adulta.

- Sistema dinorfinergico
- Sistema endocannabinoide
- Neuroinfiammazione
- Sistema di risposta allo stress (asse HPA, glucocorticoidi)



REQUISITI necessari per iniziare il periodo di internato:

√ numero massimo di esami rimanenti circa 4-5

DURATA DELL'INTERNATO: circa 6-7 MESI con FREQUENZA GIORNALIERA

✓ Possibilità di tesi all'estero o in istituzioni italiane, secondo disponibilità

Liste disponibili presso i docenti responsabili del laboratorio

(prendere contatti circa 1 anno prima)

patrizia.romualdi@unibo.it sanzio.candeletti@unibo.it laura.rullo3@unibo.it

